

ALGEBRA 1

kratek pregled rezultatov in definicij

BORIS LAVRIČ

1. Končno razsežni vektorski prostori

Vektorski prostor V nad obsegom $\mathcal{O}$ je Abelova grupa $(V, +)$ skupaj s preslikavo

$$\mathcal{O} \times V \longrightarrow V, \quad (\alpha, x) \longmapsto \alpha x,$$

ki izpolnjuje pogoje

$$(1) \quad \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y,$$

$$(2) \quad (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x,$$

$$(3) \quad (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x),$$

$$(4) \quad 1 \cdot x = x$$

za vsak par $\alpha, \beta \in \mathcal{O}$ in vsak par $x, y \in V$.

Elemente množice V navadno imenujemo *vektorji*, elemente obsega $\mathcal{O}$ *skalarji*, preslikavo $(\alpha, x) \longmapsto \alpha x$ iz definicije pa *množenje s skalarji*.

Primer vektorskega prostora nad obsegom $\mathcal{O}$ je množica urejenih n -teric

$$\mathcal{O}^n = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \alpha_i \in \mathcal{O}, \ i = 1, \dots, n\},$$

opremljena z operacijama seštevanja in množenja s skalarji, ki sta definirani po komponentah:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n),$$

$$\alpha(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = (\alpha\gamma_1, \dots, \alpha\gamma_n).$$

Naj bo V vektorski prostor nad obsegom $\mathcal{O}$ in $U \subseteq V$ podmnožica, zaprta za seštevanje in množenje s skalarji. Potem je $(U, +)$ Abelova grupa, množenje s skalarji $\mathcal{O} \times U \longrightarrow U$, podedovano iz $\mathcal{O} \times V \longrightarrow V$, pa ustreza pogojem iz definicije vektorskega prostora, torej je U (skupaj z operacijama) vektorski prostor nad $\mathcal{O}$. Pravimo mu *vektorski podprostor* (vektorskega) prostora V .

Vsak vektorski podprostor vsebuje ničelni vektor 0 in je zaprt za tvorjenje linearnih kombinacij. Presek vektorskih podprostorov danega vektorskega prostora je vektorski podprostor.

Naj bo $M \subseteq V$. Presek vseh vektorskih podprostorov prostora V , ki vsebujejo M , imenujemo *linearna ogrinjača* množice M in zaznamujemo z $\text{Lin } M$. Linearna ogrinjača

množice M je vektorski podprostor, ki vsebuje M in je vsebovan v vsakem vektorskem podprostoru, ki vsebuje M . Linearna ogrinjača prazne množice je trivialni podprostor $\{0\}$, linearna ogrinjača neprazne množice M pa je množica vseh *linearnih kombinacij* elementov iz M , torej elementov oblike

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k, \quad \alpha_i \in \mathcal{O}, v_i \in M, \quad i = 1, \dots, k.$$

Podmnožici $M \subseteq V$ pravimo *ogrodje* (vektorskega prostora V), kadar je njena linearna ogrinjača enaka V , torej $\text{Lin } M = V$. Podmnožica M netrivialnega vektorskega prostora V je njegovo ogrodje natanko takrat, kadar je vsak $v \in V$ linearna kombinacija vektorjev iz množice M .

Naj bosta V_1 in V_2 podprostora vektorskega prostora V . Linearna ogrinjača njune unije $\text{Lin}(V_1 \cup V_2)$ je vektorski podprostor

$$V_1 + V_2 = \{v_1 + v_2 : v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\},$$

ki mu pravimo *vsota podprostorov* V_1 in V_2 . Kadar velja $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, je vsota $V_1 + V_2$ *prema* ali *direktna*. Za direktno vsoto podprostorov V_1 in V_2 uporabljamo zapis $V_1 \oplus V_2$.

Izrek 1.1. *Naj bosta V_1 in V_2 podprostora vektorskega prostora V . Potem je $V = V_1 \oplus V_2$ natanko takrat, kadar za vsak $x \in V$ obstajata enolično določena elementa $v_1 \in V_1$ in $v_2 \in V_2$, za katera velja $x = v_1 + v_2$.*

Vektorji $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ so *linearno neodvisni*, kadar za njihove linearne kombinacije velja sklep

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0,$$

in *linearno odvisni*, kadar ta sklep ne velja. Vektorji $v_1, v_2, \dots, v_k$ so linearno odvisni natanko takrat, kadar je vsaj eden od njih linearna kombinacija drugih.

Podmnožica $M \subseteq V$ je *linearno neodvisna*, kadar vsako njeno končno podmnožico tvorijo linearno neodvisni vektorji. Baza vektorskega prostora V je linearno neodvisna podmnožica $B \subseteq V$, ki je hkrati ogrodje prostora V .

Izrek 1.2. *Naj bo V netrivialen vektorski prostor s končnim ogrođjem. Potem lahko iz tega ogrođja izberemo bazo prostora V . Vse baze prostora V imajo enako elementov.*

Število elementov (katerekoli) baze vektorskega prostora V s končnim ogrođjem imenujemo *razsežnost* ali *dimenzija* prostora V in zaznamujemo z $\dim V$. Dimenzija trivialnega prostora $\{0\}$ je enaka 0. Kadar ima vektorski prostor V končno ogrodje, pravimo, da je *končno razsežen* in to zaznamujemo z $\dim V < \infty$.

Vektorski prostor urejenih n -teric $\mathcal{O}^n$ je n -razsežen. Elementi

$$e_i = (\overbrace{0, \dots, 0}^{i-1}, 1, 0, \dots, 0) \in \mathcal{O}^n, \quad i = 1, \dots, n,$$

tvorijo bazo prostora $\mathcal{O}^n$, ki jo imenujemo *standardna baza*.

Izrek 1.3. *Podmnožica vektorskega prostora V , sestavljena iz (med sabo različnih) vektorjev $v_1, \dots, v_n \in V$ je baza prostora V natanko takrat, kadar za vsak vektor $x \in V$ obstaja natanko ena taka urejena n -terica skalarjev $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, da velja $x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.*

Izrek 1.4. *Netrivialen končno razsežen vektorski prostor nad obsegom $\mathcal{O}$ je izomorfen vektorskemu prostoru $\mathcal{O}^n$, kjer je $n = \dim V$.*

Izrek 1.5. *Končno razsežna vektorska prostora nad istim obsegom sta izomorfna natanko takrat, kadar imata enako razsežnost.*

Izrek 1.6. *Naj bosta V_1 in V_2 vektorska podprostora končno razsežnega vektorskega prostora V . Potem velja*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

V posebnem primeru $V = V_1 \oplus V_2$ velja ekvivalenca

$$V = V_1 \oplus V_2 \iff \dim V = \dim V_1 + \dim V_2.$$

Naj bo V vektorski prostor nad obsegom $\mathcal{O}$ in U njegov podprostor. Relacija $\sim$ na V , definirana s predpisom

$$x \sim y \iff x - y \in U$$

je ekvivalenčna relacija, usklajena z operacijama vektorskega prostora V . Ekvivalenčni razred $[x]$ elementa $x \in V$ je enak

$$x + U = \{x + u : u \in U\}.$$

Kvocienčna množica $V/\sim = \{[x] : x \in V\}$, opremljena z operacijama

$$[x] + [y] = [x + y], \quad \alpha[x] = [\alpha x], \quad x, y \in V, \alpha \in \mathcal{O}$$

je vektorski prostor nad $\mathcal{O}$. Imenujemo ga *kvocienčni prostor* (vektorskega prostora V po podprostoru U) in zaznamujemo z V/U .

Izrek 1.7. *Naj bo U podprostor končno razsežnega vektorskega prostora V . Potem je kvocienčni prostor V/U končno razsežen in ima dimenzijo*

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

2. Linearne preslikave in matrike

Naj bosta U in V vektorska prostora nad obsegom $\mathcal{O}$. Preslikava $\mathcal{A} : V \longrightarrow U$ je *linearna* ali *homomorfizem vektorskih prostorov*, kadar izpolnjuje pogoja

$$(1) \quad \mathcal{A}(x + y) = \mathcal{A}x + \mathcal{A}y \quad \forall x, y \in V.$$

$$(2) \quad \mathcal{A}(\alpha x) = \alpha \mathcal{A}x \quad \forall \alpha \in \mathcal{O}, \forall x \in V.$$

Pogoj (1) imenujemo *aditivnost*, pogoj (2) pa *homogenost* preslikave $\mathcal{A}$.

Jedro linearne preslikave $\mathcal{A} : V \longrightarrow U$ je množica

$$\ker \mathcal{A} = \{x \in V : \mathcal{A}x = 0\},$$

slika te preslikave pa njena zaloga vrednosti

$$\operatorname{im} \mathcal{A} = \{\mathcal{A}x : x \in V\}.$$

Jedro $\ker \mathcal{A}$ je podprostor domene V , slika $\operatorname{im} \mathcal{A}$ pa podprostor kodomene U . Linearna preslikava je injektivna natanko takrat, kadar je njeno jedro trivialno.

Izrek 2.1. Naj bosta U in V vektorska prostora istim obsegom in $\mathcal{A} : V \longrightarrow U$ linearna preslikava. Potem je preslikava $F : V/\ker \mathcal{A} \longrightarrow \operatorname{im} \mathcal{A}$, definirana s predpisom $F([x]) = \mathcal{A}x$, $x \in V$, izomorfizem med kvocientnim prostorom $V/\ker \mathcal{A}$ in sliko $\operatorname{im} \mathcal{A}$. Kadar je preslikava $\mathcal{A}$ injektivna, sta vektorska prostora V in $\operatorname{im} \mathcal{A}$ izomorfna.

Naj bo odslej obseg $\mathcal{O}$ komutativen. Množica vseh linearnih preslikav $\mathcal{A} : V \longrightarrow U$, opremljena z operacijama seštevanja in množenja s skalarji iz $\mathcal{O}$, definiranimi po točkah, je vektorski prostor nad $\mathcal{O}$. Zaznamujemo ga z $\mathcal{L}(V, U)$.

Izrek 2.2. Naj bosta U in V netrivialna končno razsežna vektorska prostora nad obsegom $\mathcal{O}$ z dimenzijama $m = \dim U$, $n = \dim V$. Potem je vektorski prostor $\mathcal{L}(V, U)$ linearnih preslikav $V \longrightarrow U$ izomorfen vektorskemu prostoru $m \times n$ matrik $\mathcal{O}^{m,n}$.

Izomorfizem med $\mathcal{L}(V, U)$ in $\mathcal{O}^{m,n}$ lahko konstruiramo tako, da izberemo urejeni bazi prostorov V , U in vsaki preslikavi iz $\mathcal{L}(V, U)$ priredimo matriko glede na ti dve bazi. V posebnem primeru $V = \mathcal{O}^n$, $U = \mathcal{O}^m$ z izbranimi standardnima bazama s takim izomorfizmom $\mathcal{L}(\mathcal{O}^n, \mathcal{O}^m) \longrightarrow \mathcal{O}^{m,n}$ poistovetimo oba prostora. Preslikava $A \in \mathcal{L}(\mathcal{O}^n, \mathcal{O}^m)$ je torej matrika, katere stolpci so slike standardne baze $\{f_1, \dots, f_n\}$ prostora $\mathcal{O}^n$, $A^{(j)} = Af_j$, $j = 1, \dots, n$.

Izrek 2.3. Naj bosta U in V končno razsežna vektorska prostora nad istim obsegom in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$. Potem jedro in slika preslikave $\mathcal{A}$ veže formula

$$\dim V = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \operatorname{im} \mathcal{A}.$$

Razsežnost slike preslikave $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$ med končno razsežnima vektorskima prostoro imenujemo *rang* (preslikave) $\mathcal{A}$ in zaznamujemo z $\text{rang } \mathcal{A}$, torej

$$\text{rang } \mathcal{A} = \dim \text{im } \mathcal{A}.$$

Izrek 2.4. *Naj bosta U in V končno razsežna vektorska prostora nad istim obsegom in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$. Potem je $\mathcal{A}$ je injektivna natanko takrat, kadar je $\text{rang } \mathcal{A} = \dim V$, surjektivna pa natanko takrat, kadar je $\text{rang } \mathcal{A} = \dim U$. Rang preslikave $\mathcal{A}$ je enak rangu matrike, ki pripada tej preslikavi (glede na katerikoli bazi).*

Izrek 2.5. *Rang matrike je enak največjemu številu njenih linearno neodvisnih stolpcev. Matrika in njena transponiranka imata enak rang. Rang matrike je enak največjemu številu njenih linearno neodvisnih vrstic.*

Izrek 2.6. *Sistem linearnih enačb $Ax = b$ je neprotisloven natanko takrat, kadar ima matrika A enak rang kot razširjena matrika $[A | b]$. Kadar je sistem $Ax = b$ neprotisloven, je množica vseh njegovih rešitev enaka $v + \ker A$, kjer je v poljubna rešitev tega sistema.*

Naj bo V vektorski prostor nad obsegom $\mathcal{O}$. Linearno preslikavo iz V v $\mathcal{O}$ imenujemo *linearni funkcional*, vektorski prostor $V^* = \mathcal{L}(V, \mathcal{O})$ vseh linearnih funkcionalov na V pa *dualni prostor* prostora V . Za končno razsežen vektorski prostor V velja $\dim V^* = \dim V$.

Naj bo $\{v_1, \dots, v_n\}$ baza n -razsežnega prostora V . Podmnožica $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \subseteq V^*$, ki ustreza pogoju $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$ za vsak $i, j \in \{1, \dots, n\}$, je baza prostora V^* . Imenujemo jo *dualna baza* k bazi $\{v_1, \dots, v_n\}$.

Naj bosta U in V vektorska prostora nad $\mathcal{O}$ in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$. Za vsak $\varphi \in U^*$ je $\varphi\mathcal{A} \in V^*$, preslikava $\varphi \mapsto \varphi\mathcal{A}$ iz U^* v V^* pa je linearna. Imenujemo jo *dualna preslikava* preslikave $\mathcal{A}$ in jo zaznamujemo z $\mathcal{A}^d$. Torej

$$\mathcal{A}^d(\varphi) = \varphi\mathcal{A}, \quad \mathcal{A}^d \in \mathcal{L}(U^*, V^*).$$

Izrek 2.7. *Naj bo A matrika, ki pripada linearni preslikavi $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$ glede na dani urejeni bazi $\mathcal{V} \subseteq V$ in $\mathcal{U} \subseteq U$. Potem dualni preslikavi $\mathcal{A}^d \in \mathcal{L}(U^*, V^*)$ glede na dualni bazi k bazama $\mathcal{U}$ in $\mathcal{V}$ pripada matrika $A^\top$. Preslikava $\mathcal{A}$ in njena dualna preslikava $\mathcal{A}^d$ imata enak rang.*

Izrek 2.8. *Naj bo V netrivialen končno razsežen vektorski prostor nad obsegom $\mathcal{O}$ dimenzije $n = \dim V$. Potem je algebra $\mathcal{L}(V)$ endomorfizmov prostora V izomorfna algeabri kvadratnih $n \times n$ matrik $\mathcal{O}^{n,n}$.*

Izrek 2.9. Za endomorfizem $\mathcal{A}$ končno razsežnega vektorskega prostora V so ekvivalentne naslednje izjave:

- (1) $\mathcal{A}$ je obrnljiv;
- (2) $\mathcal{A}$ je injektiven;
- (3) $\mathcal{A}$ je surjektiven;
- (4) $\text{rang } \mathcal{A} = \dim V$.

Izrek 2.10. Kvadratna matrika reda n je obrnljiva natanko takrat, kadar je njen rang enak n .

Izrek 2.11. Naj bosta U in V netrivialna končno razsežna vektorska prostora nad istim obsegom in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$. Zaznamujmo z A matriko, ki pripada preslikavi $\mathcal{A}$ glede na urejeni bazi $\mathcal{V} \subset V$ in $\mathcal{U} \subset U$, z A' pa matriko, ki pripada $\mathcal{A}$ glede na urejeni bazi $\mathcal{V}' \subset V$ in $\mathcal{U}' \subset U$. Naj bo P prehodna matrika med bazama $\mathcal{V}$ in $\mathcal{V}'$, Q pa prehodna matrika med bazama $\mathcal{U}$ in $\mathcal{U}'$. Potem matriki A' in A povezuje enakost

$$A' = Q^{-1}AP.$$

Matrika $B \in \mathcal{O}^{m,n}$ je ekvivalentna matriki $A \in \mathcal{O}^{m,n}$, $B \sim A$, kadar obstajata taki obrnljivi matriki $P \in \mathcal{O}^{n,n}$ in $Q \in \mathcal{O}^{m,m}$, da velja $B = Q^{-1}AP$.

Ekvivalentnost matrik je ekvivalenčna relacija v prostoru $\mathcal{O}^{m,n}$. Vse matrike, ki pripadajo dani linearni preslikavi, so med sabo ekvivalentne.

Izrek 2.12. Naj bosta U in V netrivialna končno razsežna vektorska prostora nad obsegom $\mathcal{O}$ in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, U)$. Potem obstajata taki urejeni bazi $\mathcal{V} \subset V$ in $\mathcal{U} \subset U$, da ima matrika $A \in \mathcal{O}^{m,n}$, ki pripada preslikavi $\mathcal{A}$ glede na ti dve bazi, obliko

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \end{bmatrix},$$

pri čemer je število enic na diagonalni enako $r = \text{rang } \mathcal{A}$, vsi drugi členi pa so ničle.

Izrek 2.13. Matriki $A, B \in \mathcal{O}^{m,n}$ sta ekvivalentni natanko takrat, kadar imata enak rang.

Izrek 2.14. Naj bo V netrivialen končno razsežen vektorski prostor in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. Zaznamujmo z A matriko, ki pripada endomorfizmu $\mathcal{A}$ glede na urejeno bazo $\mathcal{V} \subset V$, z A' pa matriko, ki pripada $\mathcal{A}$ glede na urejeno bazo $\mathcal{V}' \subset V$. Naj bo P prehodna matrika med

bazama $\mathcal{V}$ in $\mathcal{V}'$. Potem matriki A' in A povezuje enakost

$$A' = P^{-1}AP.$$

Matrika $B \in \mathcal{O}^{n,n}$ je *podobna* matriki $A \in \mathcal{O}^{n,n}$, kadar obstaja taka obrnljiva matrika $P \in \mathcal{O}^{n,n}$, da velja $B = P^{-1}AP$.

Podobnost matrik je ekvivalenčna relacija v prostoru $\mathcal{O}^{n,n}$. Vse matrike, ki pripadajo danemu endomorfizmu, so med sabo podobne.

Naj bo $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ endomorfizem končno razsežnega prostora V . Pravimo, da se $\mathcal{A}$ da *diagonalizirati*, kadar obstaja taka baza prostora V , da je matrika, ki v njej pripada endomorfizmu $\mathcal{A}$, diagonalna.

Neničelni vektor $x \in V$ imenujemo *lastni vektor* endomorfizma $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, kadar obstaja tak $\lambda \in \mathcal{O}$, da je $\mathcal{A}x = \lambda x$. Skalar λ je enolično določen z lastnim vektorjem in mu pravimo *lastna vrednost* endomorfizma $\mathcal{A}$.

Spekter endomorfizma $\mathcal{A}$ je množica vseh njegovih lastnih vrednosti. Spekter $\mathcal{A}$ zaznamujemo s $\text{sp } \mathcal{A}$.

Skalar $\lambda \in \mathcal{O}$ je lastna vrednost endomorfizma $\mathcal{A}$ natanko takrat, kadar je jedro $\ker(\mathcal{A} - \lambda I)$ netrivialno. To jedro (kadar je netrivialno) imenujemo *lastni podprostor* endomorfizma $\mathcal{A}$, ki pripada lastni vrednosti λ .

Izrek 2.15. *Endomorfizem $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ končno razsežnega prostora V se da diagonalizirati natanko takrat, kadar obstaja baza prostora V , sestavljena iz lastnih vektorjev endomorfizma $\mathcal{A}$.*

Izrek 2.16. *Lastni vektorji, ki pripadajo različnim lastnim vrednostim danega endomorfizma, so linearno neodvisni.*

Izrek 2.17. *Če ima endomorfizem končno razsežnega prostora toliko različnih lastnih vrednosti kot je dimenzija prostora, se ga da diagonalizirati.*

3. Determinante

Naj bosta U in V vektorska prostora nad (komutativnim) obsegom $\mathcal{O}$ in $n \in \mathbb{N}$. Preslikava $F : V^n \rightarrow U$ je *n-linear*, kadar so za vsako n -terico $(v_1, \dots, v_n) \in V^n$ preslikave $F_i : V \rightarrow U$, $i = 1, \dots, n$, definirane s predpisom

$$F_i(x) = F(v_1, \dots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \dots, v_n), \quad x \in V,$$

linearne. Preslikava $F : V^n \longrightarrow U$ je *antisimetrična*, kadar za vsako n -terico $(v_1, \dots, v_n) \in V^n$ velja

$$F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n),$$

kjer je $1 \leq i < j \leq n$.

V posebnem primeru $V = \mathcal{O}^n$ prostor n -teric V^n poistovetimo s prostorom kvadratnih matrik $\mathcal{O}^{n,n}$, tako da vsako n -terico stolpcev $(v_1, \dots, v_n) \in (\mathcal{O}^n)^n$ razumemo kot matriko $[v_1 \dots v_n] \in \mathcal{O}^{n,n}$, matriko $A \in \mathcal{O}^{n,n}$ pa kot n -terico njenih stolpcev $(A^{(1)}, \dots, A^{(n)}) \in (\mathcal{O}^n)^n$.

Izrek 3.1. *Naj bo $F : \mathcal{O}^{n,n} \longrightarrow \mathcal{O}$ n -linearen antisimetričen funkcional. Potem za vsako matriko $A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n \in \mathcal{O}^{n,n}$ velja*

$$F(A) = (\det A)F(I),$$

kjer je $I \in \mathcal{O}^{n,n}$ enotska matrika in

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} s(\pi) a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n},$$

vsota pa teče po vseh permutacijah

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

reda n .

Izrek 3.2. *Determinanta $\det : \mathcal{O}^{n,n} \longrightarrow \mathcal{O}$, $A \longmapsto \det A$, je n -linearen antisimetričen funkcional, ki ustreza pogoju $\det I = 1$.*

Izrek 3.3. *Determinanta matrike je enaka determinanti njene transponiranke,*

$$\det A = \det A^\top,$$

izrazimo jo lahko tudi v obliki

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} s(\pi) a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n},$$

kjer vsota teče po vseh permutacijah

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ j_1 & j_2 & \dots & j_n \end{pmatrix}$$

reda n .

Kvadratna matrika $A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n$ je *zgornje trikotna* (oziroma *spodnje trikotna*), kadar ima pod diagonalo (oziroma nad diagonalo) ničle, torej $a_{ij} = 0$ za indekse $i > j$ (oziroma za indekse $i < j$). Matrika je *trikotna*, kadar je zgornje trikotna ali spodnje trikotna. Matrika je *diagonalna*, kadar je zgornje trikotna in spodnje trikotna. Kvadratna matrika A je *bločno diagonalna*, kadar ima obliko

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{bmatrix},$$

pri čemer so $A_1, \dots, A_k$ kvadratne matrike (diagonalni bloki), vsi drugi členi pa so enaki 0. Pravimo tudi, da je A *direktna vsota* matrik $A_1, \dots, A_k$ in zapišemo $A = A_1 \oplus \dots \oplus A_k$.

Izrek 3.4. *Determinanta trikotne matrike je enaka produktu njenih diagonalnih členov. Determinanta bločno diagonalne matrike je enaka produktu determinant njenih diagonalnih blokov.*

Izrek 3.5. *Determinanta je multiplikativen funkcional,*

$$\det(AB) = (\det A)(\det B).$$

Izrek 3.6. *Podobni matriki imata enako determinanto.*

Vse matrike, ki pripadajo danemu endomorfizmu $\mathcal{A}$ (ne glede na izbor baze), imajo enako determinanto. Ta determinanta je po definiciji *determinanta endomorfizma* $\mathcal{A}$. Znamujemo jo z $\det \mathcal{A}$.

Naj bo A kvadratna matrika reda n in $i, j \in \{1, \dots, n\}$. *Podmatrika* A_{ij} (matrike A) je kvadratna matrika reda $n - 1$, ki jo dobimo tako, da iz matrike A odstranimo njeno i -to vrstico in njen j -ti stolpec. *Poddeterminanta* $\tilde{a}_{ij}$ je definirana z enakostjo

$$\tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}.$$

Poddeterminante matrike A sestavljajo njeno prirejenko

$$\tilde{A} = [\tilde{a}_{ij}]_{i,j=1}^n.$$

Izrek 3.7. *Matrika in njena prirejenka sta povezani z enakostjo*

$$A\tilde{A}^\top = \tilde{A}^\top A = (\det A)I.$$

Izrek 3.8. *Kvadratna matrika A je obrnljiva natanko takrat, kadar je $\det A \neq 0$. Inverz je večkratnik transponirane prirejenke:*

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \tilde{A}^\top.$$

Endomorfizem končno razsežnega vektorskega prostora je obrnljiv natanko takrat, kadar ima neničelno determinanto.

Izrek 3.9. Homogeni sistem linearnih enačb $Ax = 0$ s kvadratno matriko A ima netrivialno rešitev natanko takrat, kadar je $\det A = 0$.

Izrek 3.10. Sistem linearnih enačb $Ax = b$ s kvadratno matriko A , ki ima neničelno determinanto, ima natanko eno rešitev $x \in \mathcal{O}^n$. Njene komponente lahko izračunamo po Cramérjevem pravilu

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, \quad j = 1, \dots, n,$$

kjer je A_j matrika $[A^{(1)}, \dots, A^{(j-1)}, b, A^{(j+1)}, \dots, A^{(n)}]$, ki jo dobimo iz A , tako da njen j -ti stolpec $A^{(j)}$ nadomestimo s stolpcem b .

4. Zgradba endomorfizma

Naj bo A kvadratna matrika reda n , $A \in \mathcal{O}^{n,n}$. Polinom

$$\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

imenujemo *karakteristični polinom* matrike A .

Izrek 4.1. Karakteristični polinom matrike $A \in \mathcal{O}^{n,n}$ je n -te stopnje, njegov vodilni koeficient je $(-1)^n$, njegov prosti člen pa $\det A$. Skalar $\alpha \in \mathcal{O}$ je lastna vrednost matrike A natanko takrat, kadar je ničla njenega karakterističnega polinoma, torej

$$\alpha \in \text{sp } A \iff \Delta_A(\alpha) = 0.$$

Izrek 4.2. Matrika $A \in \mathcal{O}^{n,n}$ je ničla svojega karakterističnega polinoma,

$$\Delta_A(A) = 0.$$

Naj bo $A \in \mathcal{O}^{n,n}$. Polinom najnižje stopnje z ničlo A in vodilnim koeficientom 1 imenujemo *minimalni polinom* matrike A ter ga zaznamujemo z $m_A(\lambda)$.

Izrek 4.3. Minimalni polinom je enolično določen z matriko.

Izrek 4.4. Karakteristični polinom matrike $A \in \mathcal{O}^{n,n}$ je deljiv z njenim minimalnim polinomom, $m_A(\lambda) | \Delta_A(\lambda)$. Oba imata iste ničle v obsegu $\mathcal{O}$, in sicer lastne vrednosti matrike A .

Podobni matriki imata isti karakteristični in isti minimalni polinom, zato lahko definiramo *karakteristični polinom* $\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda)$ in *minimalni polinom* $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ endomorfizma $\mathcal{A}$ s formulo

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = \Delta_A(\lambda), \quad m_{\mathcal{A}}(\lambda) = m_A(\lambda),$$

kjer je A katera koli matrika, ki pripada endomorfizmu $\mathcal{A}$. Velja enakost

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{I}),$$

minimalni polinom $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ pa je polinom najnižje stopnje z ničlo $\mathcal{A}$ in vodilnim koeficientom 1.

Naj bo $\mathcal{A}$ endomorfizem vektorskega prostora V . Vektorski podprostor $U \subseteq V$ je *invarianten* za $\mathcal{A}$, kadar velja $\mathcal{A}u \in U$ za vsak $u \in U$, torej, kadar je $\mathcal{A}U \subseteq U$. Če je podprostor $U \subseteq V$ invarianten za $\mathcal{A}$, preslikavo $U \rightarrow U$, ki slika enako kot $\mathcal{A}$, zaznamujemo z $\mathcal{A}_U$ in imenujemo *zožitev endomorfizma* na (invarianten) podprostor U . Za zožitev torej velja $\mathcal{A}_U u = \mathcal{A}u$ za vsak $u \in U$.

Izrek 4.5. *Lastni podprostori endomorfizma $\mathcal{A}$ so invariantni za $\mathcal{A}$.*

Naj bo $\mathcal{A}$ endomorfizem kompleksnega n -razsežnega vektorskega prostora V , $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ pa vse njegove (med sabo različne) lastne vrednosti. Za razcepa karakterističnega in minimalnega polinoma

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}, \quad m_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

velja $1 \leq m_j \leq n_j$, $j = 1, \dots, k$, $n_1 + \dots + n_k = n$.

Korenski podprostor endomorfizma $\mathcal{A}$, ki pripada lastni vrednosti λ_j , je podprostor

$$W_j = \ker(\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{I})^{m_j}.$$

Izrek . *Vsi korenski podprostori W_j so invariantni za $\mathcal{A}$, prostor V pa je njihova direktna vsota, torej $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$.*

Zožitve endomorfizma $\mathcal{A}$ na korenske podprostore W_j , $j = 1, \dots, k$, zaznamujemo z $\mathcal{A}_j$. Torej $\mathcal{A}_j = \mathcal{A}_{W_j}$.

Izrek 4.6. *Endomorfizem kompleksnega končno razsežnega vektorskega prostora je direktna vsota svojih zožitev na korenske podprostore,*

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{A}_k.$$

Zožitev $\mathcal{A}_j$ ima eno samo lastno vrednost λ_j . Za karakteristični in minimalni polinom zožitve $\mathcal{A}_j$ velja

$$\Delta_{\mathcal{A}_j}(\lambda) = (-1)^{n_j} (\lambda - \lambda_j)^{n_j}, \quad m_{\mathcal{A}_j}(\lambda) = (\lambda - \lambda_j)^{m_j}.$$

Razsežnost korenskega podprostora W_j je enaka n_j .

Jordanova celica (s skalarjem ρ na diagonalni) je matrika oblike

$$J_\rho = \begin{bmatrix} \rho & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \rho \end{bmatrix}$$

z diagonalnimi členi ρ , enicami (na vzporednici) tik nad njimi in ničlami povsod drugod. Jordanova celica J_ρ reda 1 nima niti enic niti ničel in je enaka $[\rho]$.

Izrek 4.7. Naj bo V kompleksen končno razsežen vektorski prostor in $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(V)$ nilpotenten endomorfizem z indeksom nilpotentnosti r . Potem obstaja taka baza prostora V (Jordanova baza za $\mathcal{B}$), da je matrika $J(\mathcal{B})$, ki pripada endomorfizmu $\mathcal{B}$ v tej bazi, direktna vsota Jordanovih celic z ničlami na glavni diagonalni. Pri tem so Jordanove celice urejene po velikosti glede na red od največje do najmanjše. Število teh celic je enako razsežnosti jedra $\ker \mathcal{B}$, največja med njimi (torej prva) pa ima red r .

Izrek 4.8. Naj bo V kompleksen končno razsežen vektorski prostor in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. Potem v vsakem korenskem podprostoru W_j endomorfizma $\mathcal{A}$ obstaja taka urejena baza (Jordanova baza za zožitev $\mathcal{A}_j$), da je matrika $J(\mathcal{A}_j)$, ki pripada endomorfizmu $\mathcal{A}_j$ v tej bazi, direktna vsota Jordanovih celic z lastnimi vrednostmi λ_j na glavni diagonalni. Pri tem so Jordanove celice matrike $J(\mathcal{A}_j)$ urejene po velikosti glede na red od največje do najmanjše. Število teh celic je enako razsežnosti lastnega podprostora endomorfizma $\mathcal{A}$ za lastno vrednost λ_j , največja (prva) celica pa ima red m_j . V prostoru V obstaja taka urejena baza (Jordanova baza endomorfizma $\mathcal{A}$), da je (Jordanova) matrika $J(\mathcal{A})$, ki pripada endomorfizmu $\mathcal{A}$ v tej bazi, direktna vsota matrik $J(\mathcal{A}_j)$,

$$J(\mathcal{A}) = J(\mathcal{A}_1) \oplus \dots \oplus J(\mathcal{A}_k).$$

Jordanova matrika $J(\mathcal{A})$ je določena do vrstnega reda direktnih sumandov (blokov) $J(\mathcal{A}_j)$ natančno.

Izrek 4.9. Kvadratna kompleksna matrika A je podobna svoji Jordanovi matriki $J(A)$. Velja $J(A) = P^{-1}AP$, pri čemer je P obrnljiva matrika, katere stolpci tvorijo Jordanovo bazo matrike A . Kvadratni kompleksni matriki istega reda sta podobni natanko takrat, kadar se njuni Jordanovi matriki razlikujeta kvečjemu v vrstnem redu blokov, ki vsebujejo vse Jordanove celice z eno lastno vrednostjo na diagonalni.

Naj bo J_ρ Jordanova celica reda s , f pa kompleksna funkcija, analitična v okolici točke ρ . Potem je vrednost funkcije f pri J_ρ dana s formulo

$$f(J_\rho) = \begin{bmatrix} f(\rho) & f'(\rho) & \frac{f''(\rho)}{2} & \dots & \frac{f^{(s-1)}(\rho)}{(s-1)!} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{f''(\rho)}{2} \\ & & & \ddots & f'(\rho) \\ & & & & f(\rho) \end{bmatrix}.$$

Naj bo matrika $J = J_{\rho_1} \oplus \dots \oplus J_{\rho_t}$ direktna vsota Jordanovih celic, f pa kompleksna funkcija, analitična v okolici množice $\{\rho_1, \dots, \rho_t\}$. Potem je vrednost funkcije f pri J dana s formulo $f(J) = f(J_{\rho_1}) \oplus \dots \oplus f(J_{\rho_t})$.

Naj bo A kvadratna kompleksna matrika, $A = PJP^{-1}$, kjer je $J = J(A)$ Jordanova kanonska forma matrike A in P ustrezna obrnljiva matrika, f pa kompleksna funkcija, analitična v okolici spektra $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ matrike A . Potem je vrednost funkcije $f(A)$ dana s predpisom $f(A) = Pf(J)P^{-1}$.

Izrek 4.10. *Naj bo $\mathcal{F}(A)$ algebra kompleksnih funkcij, analitičnih v okolici spektra matrike A . Potem je preslikava $f \mapsto f(A)$ homomorfizem med algebrama $\mathcal{F}(A)$ in $\mathbb{C}^{n,n}$, ki konstantno funkcijo $1_{\mathbb{C}}$ preslika v enotsko matriko I , identično funkcijo $\text{id}_{\mathbb{C}}$ pa v A , torej*

- (1) $(f + g)(A) = f(A) + g(A)$;
- (2) $(\alpha f)(A) = \alpha f(A)$;
- (3) $(f \cdot g)(A) = f(A)g(A)$.
- (4) $1_{\mathbb{C}}(A) = I$ in $\text{id}_{\mathbb{C}}(A) = A$.

Za vsako funkcijo $f \in \mathcal{F}(A)$ je spekter slike $f(A)$ enak sliki spektra matrike A , torej $\text{spf}(A) = \{f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_k)\}$, kjer je $\text{sp}A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$.

5. Vektorski prostori s skalarnim produktom

Naj bo $\mathbb{F}$ obseg realnih ali kompleksnih števil in V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Preslikava

$$V \times V \longrightarrow \mathbb{F}, \quad (x, y) \longmapsto \langle x, y \rangle$$

je *skalarni produkt* na V , kadar izpolnjuje pogoje

- (1) $\langle x, x \rangle > 0$ za vsak $x \in V \setminus \{0\}$ in
- (2) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$,
- (3) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$,
- (4) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$

za vsak $x, y, z \in V$ in vsak $\alpha \in \mathbb{F}$.

Skalarni produkt je torej aditiven in homogen (zato linearen) v prvem faktorju. Skalarni produkt je aditiven in *poševno homogen* v drugem faktorju:

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle,$$

$$\langle x, \alpha y \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle$$

za vsak $x, y, z \in V$ in vsak $\alpha \in \mathbb{F}$. Za vsak $x \in V$ velja

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \text{in} \quad \langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0.$$

Število

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad x \in V,$$

imenujemo *norma* ali *dolžina* vektorja x . Za vsak $x \in V$ in vsak $\alpha \in \mathbb{F}$ velja enakost $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$.

Izrek 5.1. *V vektorskem prostoru V s skalarnim produktom velja ocena*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad \forall x, y \in V,$$

ki jo imenujemo tudi neenakost Cauchyja, Bunjakovskega in Schwarzja. V njej je dosežen enačaj natanko takrat, kadar sta vektorja x in y linearno odvisna.

Izrek 5.2. *V vektorskem prostoru V s skalarnim produktom velja trikotniška neenakost*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in V.$$

Če je v njej dosežen enačaj, sta vektorja x in y linearno odvisna.

Naj bo V vektorski prostor s skalarnim produktom. Vektorja $x, y \in V$ sta med sabo pravokotna ali *ortogonalna*, $x \perp y$, kadar velja $\langle x, y \rangle = 0$. Podmnožica $M \subseteq V$ je *ortogonalna*, kadar za vsak par $x, y \in M$, $x \neq y$, velja $\langle x, y \rangle = 0$. Podmnožica $M \subseteq V$ je *ortonormirana*, kadar je ortogonalna in za vsak $x \in M$ velja $\|x\| = 1$.

Izrek 5.3. *Naj bo M podmnožica vektorskega prostora s skalarnim produktom. Če je M ortogonalna, je $M \setminus \{0\}$ linearno neodvisna. Če je M ortonormirana, je linearno neodvisna.*

Izrek 5.4. *Naj bodo $x_1, \dots, x_m$ linearno neodvisni elementi vektorskega prostora V s skalarnim produktom. Potem obstaja taka ortogonalna podmnožica $\{y_1, \dots, y_m\}$ prostora V , da je*

$$\text{Lin}\{y_1, \dots, y_k\} = \text{Lin}\{x_1, \dots, x_k\}, \quad k = 1, \dots, m.$$

Vektorje y_j lahko dobimo s pomočjo rekurzivne formule

$$y_k = x_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle x_k, y_j \rangle}{\|y_j\|^2} y_j, \quad k = 1, \dots, m.$$

Vektorji $z_j = \frac{y_j}{\|y_j\|}$ tvorijo ortonormirano množico $\{z_1, \dots, z_m\}$, ki ustreza pogoju

$$\text{Lin}\{z_1, \dots, z_k\} = \text{Lin}\{x_1, \dots, y_k\}, \quad k = 1, \dots, m.$$

Izrek 5.5. Vsak netrivialen končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom ima ortonormirano bazo. Vsako ortonormirano podmnožico takšnega prostora lahko dopolnimo do ortonormirane baze.

Izrek 5.6. Netrivialen n -razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom, definiran nad obsegom $\mathbb{F}$, je izomorfen (kot vektorskih prostor s skalarnim produktom) vektorskemu prostoru $\mathbb{F}^n$ s standardnim skalarnim produktom. Končno razsežna vektorska prostora s skalarnim produktom, definirana nad istim obsegom, sta izomorfna natanko takrat, kadar imata enako dimenzijo.

Podmnožici M in N vektorskega prostora V s skalarnim produktom sta med sabo pravokotni ali ortogonalni, $M \perp N$, kadar za vsak $x \in M$ in vsak $y \in N$ velja $x \perp y$. Vsota $V = V_1 + V_2$ podprostorov $V_1 \subseteq V$ in $V_2 \subseteq V$ je ortogonalna, $V = V_1 \boxplus V_2$, kadar je $V_1 \perp V_2$. Pravokotni ali ortogonalni komplement podmnožice $M \subseteq V$ je množica $M^\perp = \{x \in V : x \perp y \ \forall y \in M\}$.

Izrek 5.7. Ortogonalna vsota podprostorov vektorskega prostora V s skalarnim produktom je direktna. Če je V ortogonalna vsota dveh podprostorov, je vsak od njiju ortogonalni komplement drugega, torej

$$V = V_1 \boxplus V_2 \implies V_1^\perp = V_2, \quad V_2^\perp = V_1.$$

Izrek 5.8. Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom in U njegov vektorski podprostor. Potem velja

$$V = U \boxplus U^\perp \quad \text{in} \quad U^{\perp\perp} = U.$$

Če je $\{v_1, \dots, v_k\}$ ortonormirana baza podprostora U , je preslikava $\mathcal{P} : V \longrightarrow V$, dana s predpisom

$$\mathcal{P}x = \sum_{j=1}^k \langle x, v_j \rangle v_j, \quad x \in V,$$

pravokotni projektor prostora V na podprostor U .

6. Hermitsko adjungirani in normalni endomorfizmi

Naj bo V vektorski prostor s skalarnim produktom in $y \in V$. Potem je preslikava $\varphi_y : V \longrightarrow \mathbb{F}$, definirana s predpisom $\varphi_y(x) = \langle x, y \rangle$, linearen funkcional, torej $\varphi_y \in V^*$.

Izrek 6.1. *Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom. Za vsak linearen funkcional $\varphi \in V^*$ obstaja tak element $y \in V$, da je $\varphi = \varphi_y$, torej*

$$\varphi(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall x \in V.$$

Pri tem je element y enolično določen s funkcionalom φ .

Izrek 6.2. *Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom in $\mathcal{A}$ endomorfizem na njem, $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. Potem obstaja tak endomorfizem $\mathcal{A}^* \in \mathcal{L}(V)$, da je*

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle \quad \forall x, y \in V.$$

Preslikavo $\mathcal{A}^*$ imenujemo *hermitsko adjungirani* endomorfizem (endomorfizma $\mathcal{A}$) in je enolično določena z enakostjo iz izreka.

Izrek 6.3. *Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom. Preslikava $\mathcal{L}(V) \longrightarrow \mathcal{L}(V)$, dana s predpisom $\mathcal{A} \longmapsto \mathcal{A}^*$, ima naslednje lastnosti:*

- (1) $\mathcal{A}^{**} = \mathcal{A}$;
- (2) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$;
- (3) $(\alpha\mathcal{A})^* = \overline{\alpha}\mathcal{A}^*$;
- (4) $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$;
- (5) $\mathcal{I}^* = \mathcal{I}$, $0^* = 0$.

Preslikava $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}^$ je torej involucija in poševni antiautomorfizem algebre $\mathcal{L}(V)$.*

Izrek 6.4. *Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. Potem je podprostor $U \subseteq V$ invarianten za $\mathcal{A}$ natanko takrat, kadar je njegov pravokotni komplement $U^\perp$ invarianten za $\mathcal{A}^*$.*

Izrek 6.5. *Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom, $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ in $A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n$ matrika, ki pripada endomorfizmu $\mathcal{A}$ v (urejeni) ortonormirani bazi $\{v_1, \dots, v_n\}$. Potem je*

$$a_{ij} = \langle \mathcal{A}v_j, v_i \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\},$$

hermitsko adjungiranemu endomorfizmu $\mathcal{A}^$ pa v tej bazi pripada hermitska transponiranka $A^H = \overline{A}^\top$ matrike A .*

Endomorfizem $\mathcal{A}$ končno razsežnega vektorskega prostora s skalarnim produktom je *normalen*, kadar velja $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$. Matrika $A \in \mathbb{F}^{n,n}$ je *normalna*, kadar velja $AA^H = A^H A$.

Izrek 6.6. Naj bo V končno razsežen vektorski prostor s skalarnim produktom in $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. Potem je $\mathcal{A}$ normalen natanko takrat, kadar velja

$$\langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle = \langle \mathcal{A}^*x, \mathcal{A}^*y \rangle \quad \forall x, y \in V.$$

Izrek . Normalen endomorfizem $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ ima naslednje lastnosti:

- (1) $\|\mathcal{A}x\| = \|\mathcal{A}^*x\|$ za vsak $x \in V$;
- (2) $\ker \mathcal{A} = \ker \mathcal{A}^*$;
- (3) Če je $\mathcal{A}x = \lambda x$, potem je $\mathcal{A}^*x = \bar{\lambda}x$.

Izrek 6.7. Lastni vektorji normalnega endomorfizma, ki pripadajo različnim lastnim vrednostim, so paroma pravokotni med sabo. Če ima normalen endomorfizem na n -razsežnem vektorskem prostoru s skalarnim produktom n različnih lastnih vrednosti, se da diagonalizirati v ortonormirani bazi.

Izrek 6.8. Normalni endomorfizem končno razsežnega kompleksnega vektorskega prostora s skalarnim produktom (unitarnega prostora) se da diagonalizirati v ortonormirani bazi. Normalni endomorfizem končno razsežnega realnega vektorskega prostora s skalarnim produktom (evklidskega prostora), katerega karakteristični polinom ima vse ničle realne, se da diagonalizirati v ortonormirani bazi.

Endomorfizem $\mathcal{A}$ končno razsežnega vektorskega prostora s skalarnim produktom je *sebi adjungiran*, kadar velja $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$. Matrika $A \in \mathbb{F}^{n,n}$ je *hermitska*, kadar velja $A^H = A$. Realna matrika je hermitska natanko takrat, kadar je simetrična.

Izrek 6.9. Sebi adjungirani endomorfizem končno razsežnega vektorskega prostora s skalarnim produktom se da diagonalizirati v ortonormirani bazi. Pripadajoča diagonalna matrika (z lastnimi vrednostmi endomorfizma na diagonalni) je realna.

Endomorfizem $\mathcal{A}$ končno razsežnega vektorskega prostora s skalarnim produktom je *unitaren*, kadar velja $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{I}$. Matrika $A \in \mathbb{F}^{n,n}$ je *unitarna*, kadar velja $AA^H = A^H A = I$. Realna unitarna matrika je *ortogonalna*, $AA^T = A^T A = I$.

Izrek 6.10. Za endomorfizem $\mathcal{A}$ končno razsežnega vektorskega prostora V s skalarnim produktom so ekvivalentne naslednje izjave:

- (1) $\mathcal{A}$ je unitaren, $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{I}$;

(2) $\mathcal{A}$ je avtomorfizem prostora s skalarnim produktom,

$$\langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in V;$$

(3) $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{I}$ ali $\mathcal{A} \mathcal{A}^* = \mathcal{I}$.

(4) $\mathcal{A}$ je izometrija, $\|\mathcal{A}x\| = \|x\|$ za vsak $x \in V$.

Izrek 6.11. Unitarni endomorfizem končno razsežnega kompleksnega vektorskega prostora s skalarnim produktom se da diagonalizirati v ortonormirani bazi. Pripadajoča diagonalna matrika ima na diagonalni člene (lastne vrednosti endomorfizma) z absolutno vrednostjo 1.

Izrek 6.12. Množica vseh unitarnih endomorfizmov končno razsežnega vektorskega prostora s skalarnim produktom je zaprta za množenje in invertiranje, torej je grupa za množenje.

Izrek 6.13. Endomorfizem $\mathcal{A}$ končno razsežnega vektorskega prostora V s skalarnim produktom je unitaren natanko takrat, kadar vsako (ali vsaj eno) ortonormirano bazo prostora V preslika v ortonormirano množico. Prehodna matrika med dvema ortonormiranimi bazama prostora V je unitarna.

Matrika $B \in \mathbb{C}^{n,n}$ je unitarno podobna matriki $A \in \mathbb{C}^{n,n}$, kadar obstaja taka unitarna matrika $U \in \mathbb{C}^{n,n}$, da je $B = U^H A U$. Unitarna podobnost je ekvivalenčna relacija na $\mathbb{C}^{n,n}$. Vse matrike, ki pripadajo danemu endomorfizmu končno razsežnega vektorskega prostora s skalarnim produktom v ortonormiranih bazah, so med sabo unitarno podobne.

Izrek 6.14. Normalna kompleksna matrika je unitarno podobna diagonalni matriki, hermitska matrika je unitarno podobna realni diagonalni matriki, realna simetrična matrika pa je ortogonalno podobna (realni) diagonalni matriki.

Sebi adjungirani endomorfizem $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ je pozitivno semidefiniten, kadar velja

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in V.$$

Kadar v zgornji neenakosti za vsak $x \neq 0$ velja stroga neenakost, pravimo, da je (sebi adjungirani) endomorfizem $\mathcal{A}$ pozitivno definiten.

Izrek 6.15. Sebi adjungirani endomorfizem $\mathcal{A}$ je pozitivno semidefiniten natanko takrat, kadar so vse njegove lastne vrednosti nenegativne, pozitivno definiten pa natanko takrat, kadar so vse njegove lastne vrednosti (strogo) pozitivne.

Izrek 6.16. *Realna simetrična matrika A je pozitivno definitna natanko takrat, kadar koeficienti a_j njenega karakterističnega polinoma*

$$\Delta_A(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_n\lambda^n$$

alternirajo po predznaku, torej kadar velja $(-1)^j a_j > 0$, $j = 0, 1, \dots, n$.

Izrek 6.17. *Simetrična matrika $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ je pozitivno definitna natanko takrat, kadar imajo njene vogalne podmatrike $A_k = [a_{ij}]_{i,j=1}^k$ pozitivne determinante, $\det A_k > 0$, $k = 1, \dots, n$.*

7. Kvadratni funkcionali

Izrek 7.1. *Za vsak bilinearen funkcional $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ obstaja taka matrika $A \in \mathbb{R}^{n,n}$, da velja*

$$F(x, y) = \langle Ax, y \rangle = y^\top Ax, \quad x, y \in \mathbb{R}^n,$$

kjer $\langle \cdot, \cdot \rangle$ označuje standardni skalarni produkt v $\mathbb{R}^n$.

Kvadratni funkcional na prostoru $\mathbb{R}^n$ je funkcija $K : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ oblike $K(x) = F(x, x)$, kjer je $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ bilinearen funkcional. Za vsak kvadratni funkcional K na $\mathbb{R}^n$ obstaja taka realna simetrična matrika $A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n$, da je $K = K_A$, kjer je

$$K_A(x) = \langle Ax, x \rangle = x^\top Ax, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Kvadratni funkcional lahko izrazimo s komponentami spremenljivke x :

$$K_A(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n.$$

Naj bo P obrnljiva realna kvadratna matrika reda n in $x = Py$, $y \in \mathbb{R}^n$, potem velja

$$K_A(x) = x^\top Ax = (Py)^\top APy = y^\top P^\top APy = K_{P^\top AP}(y),$$

torej je $K_A(x) = K_B(y)$ za realno simetrično matriko $B = P^\top AP$.

Realna kvadratna matrika B je *kongruentna* realni simetrični matriki A , kadar obstaja taka realna obrnljiva matrika P , da je $B = P^\top AP$. Kongruentnost je ekvivalenčna relacija na množici vseh realnih simetričnih matrik danega reda.

Izrek 7.2. *Realna simetrična matrika A je kongruentna diagonalni matriki*

$$B = \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & O_r \end{bmatrix},$$

kjer I_s označuje enotsko matriko reda s , O_r pa ničelno matriko reda r (v primerih $p = 0$, $q = 0$ in $r = 0$ matrik ni). Števili p in q sta enolično določeni z matriko A , njuna vsota pa je enaka rangi matrike A .

Izrek 7.3. Vsak kvadratni funkcional spremenljivke x se da zapisati v novi spremenljivki y s samimi popolnimi kvadrati

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2,$$

pri čemer prehod $x = Py$ med spremenljivkama omogoča obrnljiva matrika P , za katero je $B = P^\top A P$ diagonalna matrika iz prejšnjega izreka.

Krivulja drugega reda je množica rešitev $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ enačbe

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

z danimi realnimi koeficienti $a, b, \dots, f$, ki ustrezajo pogoju $|a| + |b| + |c| > 0$. Kvadratni del enačbe je kvadratna forma, določena z neničelno (realno simetrično) matriko

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

linearni del pa linearna forma, dana z vektorjem (d, e) .

Z ortogonalno matriko Q , katere stolpca sta med sabo pravokotna normirana lastna vektorja matrike A , uvedemo novi spremenljivki u, v in diagonaliziramo A ,

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = Q^\top \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad Q^\top A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

Enačba krivulje ima v novih spremenljivkah obliko

$$\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2 + pu + qv + r = 0,$$

pri čemer sta λ_1, λ_2 (realni) lastni vrednosti A in je vsaj ena od njiju neničelna.

Naj bo najprej matrika A obrnljiva, torej $ac - b^2 = \det A = \lambda_1 \lambda_2 \neq 0$. Potem s translacijo vektorja $(u, v)^\top$ za ustrezen vektor $(\alpha, \beta)^\top$ in uvedbo novih spremenljivk

$$X = u + \alpha, \quad Y = v + \beta$$

enačbo krivulje poenostavimo do

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + s = 0,$$

pri čemer je $\lambda_1 \neq 0$, $\lambda_2 \neq 0$. Če je $ac - b^2 > 0$, je krivulja elipsa (v posebnem krožnica), točka ali prazna množica, če pa je $ac - b^2 < 0$, je krivulja hiperbola ali par premic, ki se sekata.

Naj bo zdaj matrika A neobrnljiva, torej $ac - b^2 = \det A = \lambda_1 \lambda_2 = 0$. Ena od lastnih vrednosti, je tedaj enaka 0, druga pa ne. Enačbo krivulje podobno kot v prejšnjem primeru lahko poenostavimo v

$$\lambda_1 X^2 + qY + s = 0 \quad \text{ali} \quad \lambda_2 Y^2 + pX + s = 0,$$

pri čemer je $\lambda_1 \neq 0$ v prvem primeru in $\lambda_2 \neq 0$ v drugem. V splošnem je krivulja parabola, lahko pa je sestavljena iz dveh vzporednic, ene (dvojne) premice ali pa je prazna množica.

Ploskev drugega reda je množica rešitev $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ enačbe

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + ex + fy + gz + h = 0$$

z danimi realnimi koeficienti, pri čemer je realna simetrična matrika $A = [a_{ij}]_{i,j=1}^3$, ki določa kvadratni del enačbe $K_A(x, y, z)$, različna od nič.

Z ortogonalno matriko Q , katere stolpci so med sabo pravokotni normirani lastni vektorji matrike A , uvedemo nove spremenljivke in diagonaliziramo A ,

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = Q^\top \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad Q^\top A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

Enačba ploskve ima v novih spremenljivkah obliko

$$\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2 + \lambda_3 w^2 + pu + qv + rw + s = 0,$$

pri čemer so λ_1, λ_2 in λ_3 (realne) lastne vrednosti A in je vsaj ena od njih neničelna.

Naj bo najprej matrika A obrnjljiva, torej $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0$. Potem z ustrezno translacijo vektorja $(u, v, w)^\top$ in uvedbo novih spremenljivk

$$X = u + \alpha, \quad Y = v + \beta, \quad Z = w + \gamma$$

enačbo krivulje poenostavimo do

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + \lambda_3 Z^2 + t = 0.$$

Nato ločimo naslednji možnosti.

Če so vse lastne vrednosti matrike A istega predznaka (torej, kadar je A kongruentna I ali $-I$), lahko enačbo preoblikujemo v

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = d, \quad d \in \{-1, 1, 0\}.$$

Ploskev je tedaj elipsoid (v posebnem sfera), točka ali prazna množica.

Če lastne vrednosti matrike A nimajo istega predznaka, lahko enačbo preoblikujemo v

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = d, \quad d \in \{-1, 1, 0\}.$$

Ploskev je tedaj pri $d = 1$ enodelni eliptični hiperboloid, pri $d = -1$ dvodelni eliptični hiperboloid, pri $d = 0$ pa eliptični stožec.

Naj bo zdaj matrika A neobrnljiva, torej $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0$. Podobno kot v prejšnjih primerih lahko enačbo ploskve preoblikujemo v eno od naslednjih možnosti.

Če sta dve lastni vrednosti A neničelni in istega predznaka, na primer $\lambda_1 \lambda_2 > 0$, potem dobimo bodisi

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = d, \quad d \in \{-1, 1, 0\}$$

bodisi

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 2pZ, \quad p \neq 0.$$

V prvem primeru je ploskev eliptični valj, premica ali prazna množica, v drugem pa eliptični paraboloid.

Če sta dve lastni vrednosti A neničelni in različnih predznakov, na primer $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, potem dobimo bodisi

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = d, \quad d \in \{-1, 1, 0\}$$

bodisi

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 2pZ, \quad p \neq 0.$$

V prvem primeru je ploskev hiperbolični valj ali ravnini, ki se sekata, v drugem pa hiperbolični paraboloid.

Če je le ena lastna vrednost A različna od nič, na primer $\lambda_1 \neq 0$, potem dobimo bodisi

$$X^2 = c, \quad c \in \mathbb{R},$$

bodisi

$$X^2 = 2pY + 2qZ, \quad |p| + |q| > 0.$$

V prvem primeru je ploskev sestavljena iz dveh vzporednih ravnin, ene (dvojne) ravnine, lahko pa je prazna množica, v drugem primeru pa je parabolični valj.